

ИППП – это группа инфекционных заболеваний, которые передаются в основном посредством полового контакта от больного человека к здоровому.

ИППП передается:

- при половых контактах с зараженным человеком;
- при использовании общих шприцев и игл при введении внутривенно каких-либо веществ;
- при телесном контакте с человеком, у которого имеются высыпания и язвочки, характерные для ИППП;
- при контакте с кровью зараженного человека;
- при использовании нестерильного медицинского инструмента;
- от матери к ребенку во время

Осложнения ИППП

ИППП опасны тем, что эти инфекции вызывают многочисленные воспалительные заболевания, нарушают функции органов и систем организма, особенно репродуктивную функцию:

- мужчин – нарушение эрекции, преждевременное семяизвержение, стертый оргазм,
- женщин – не вынашивание беременности, угроза выкидышей, опасность преждевременных родов вплоть до бесплодия.



Проявление первых симптомов ИППП:

- ВИЧ-инфекция—месяцы/годы;
- Сифилис — 1-12 недель;
- Гонорея — 2-21 дня;
- Трихомониаз — 5-28 дней;
- Папилломавирус —недели/месяцы;
- Хламидиоз—2-7 дня;
- Вирус герпеса— 1-30 дней;

Симптомы ИППП

- покраснение;
- боли во время полового акта;
- болезненное и частое мочеиспускание;
- бородавки или язвочки в области половых органов;
- зуд и жжение в области половых органов;
- выделения;
- необычные кровотечения.

Профилактика ИППП

Отказ от рискованного сексуального поведения является одним из самых эффективных способов профилактики. Безопасное сексуальное поведение включает в себя:

- отказ от раннего начала половой жизни;
 - исключение случайных половых связей;
 - использование барьерных контрацептивов (презерватив).
- В случае подозрения на ИППП, случайном половом контакте с сомнительным партнером следует обратиться в лечебное учреждение.